

2033. *O. exaltata* (a) subsp. *exaltata* Ten. [= *O. aranifera* subsp. *exaltata* (Ten.) E.G. Camus; *O. sphegodes* subsp. *sicula* E. Nelson ex Soó] – *O. elevata* – G bulb – 20-50 cm. Pianta slanciata e robusta, f. spesso. Inflor. abbastanza densa con 4-15 fi.; sepalì rosa o biancastri (raram. verdi), i lat. (patenti) formanti un angolo di ca. 120° con il centr. (eretto); petalì glabri, oblunghi, più scuri dei sepalì, a margini ondulati. Labello intero o subtrilobo, ovale o orbicolare, decism. convesso, bruno-rossiccio, peloso ai margini e spesso con gibbosità appena accennate; macula basale di solito semplice a forma di H o X; apicolo molto piccolo. $2n = 36$.



Garighe, prati magri, cespuglieti, boschi chiari, bordi stradali. (15-1250 m). – Fi. III-IV – Endem.

Coste tirr. dell'It. merid. e Sic.: R.



(b) subsp. *archipelagi*²⁴ (Gözl & H.R. Reinhard) Del Prete (= *O. arachnitiformis* auct. non Gren. & Philippe) – Differisce da **2033a** per i seguenti caratteri: sepalì verdi o biancastri, più raram. rosa; petalì a margini ondulati e

Pascoli, garighe, macchie, limitare dei boschi, ubiquitaria. (15-1000 m). – Fi. III-V – Endem.

Sard. e Cors.: R, localm. C.

Nota – Entità assai polimorfica, che talvolta ricorda *O. crabronifera*, talvolta *O. tyrrhena*, da cui differisce soprattutto per il differente insetto impollinatore.



(d) subsp. *tyrrhena* (Gözl & H.R. Reinhard) Del Prete (= *O. tyrrhena* Gözl & H.R. Reinhard) – *O. tirrenica* – Simile a **2033c**, da cui differisce per i petalì di solito concolori o appena più scuri dei sepalì e solo talvolta ciliati, il labello ± trapezoidale, la macula normalm. più complessa, e l'apicolo più importante, di solito tridentato.



Pascoli, garighe, macchie, margini stradali. (5-500 m). – Fi. III-IV – Endem.

Coste tirreniche, dalla Lig. al Lazio: R.



63



sovente ciliati; labello intero ± fortem. convesso, se disteso più largo che lungo, macula ± complicata o allargata, apicolo triangolare, verdastro, rivolto in avanti. $2n = 36$.

Prati magri, garighe, macchie, cespuglieti. (50-700 m). – Fi. III-IV – Endem.

Province di Foggia, Matera e Bari: RR.



Nota – Merita un confronto più approfondito l'entità segnalata nell'area murgiana (province di Brindisi, Taranto, Bari e Matera) sotto il nome di *O. mateolana*²⁵ Medagli, D'Emérico, Bianco & Ruggiero, che differisce dall'entità sopra descritta per il minor numero di fi. (3-5) e per la macula del labello più complessa ed estesa. $2n = 36$.

(c) subsp. *morisii*²⁶ (Martelli) Del Prete [= *O. aranifera* var. *morisii* Martelli; *O. morisii* (Martelli) Soó] – *O. di Moris* – 20-50 cm. F. eretto, talvolta flessuoso; inflor. ± lassa con 4-12 fi. Sepalì di solito rosati con nervatura centr. verde; petalì più corti (ca. 1/2) e più scuri dei sepalì, con margini ondulati e più scuri ai margini, spesso ciliati. Labello di forma, colore, dimensioni assai variate; gibbosità nulle o ridotte, macula a forma di H o X, talvolta ramificata, talaltra semplice; apicolo sempre presente, triangolare. $2n = 36$.



Nota 1 – Una variante dell'entità suddetta, con fiori alquanto più piccoli e sepalì verde-biancastri, petalì più scuri e rossicci con margini dentellati, compresa da alcuni autori nella variabilità di *O. sphegodes*, è stata recentem. proposta a rango specifico come *Ophrys tarquinia* P. Delforge e assegnata al gruppo di *O. exaltata* sulla base della dimensione dei fiori, del colore dei petalì, della forte convessità del labello, dell'assenza delle gibbosità basali, della estensione e complessità della macula e della cavità stigmatica alquanto stretta. Fior. IV, presente in Tosc. e Lazio sett.

Nota 2 – Un'altra variante del gruppo di *O. exaltata* con sepalì verdi, anch'essa simpatica con **2033d** nella zona costiera tirrenica dalla Lig. alla Tosc. e al Lazio centr., è stata denominata *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers. Si distinguerebbe per la macula semplice, il labello ± quadrangolare, la presenza di moderate gibbosità basali, la cavità stigmatica molto scura.

Nota 3 – Un'altra variante locale, ritenuta intermedia tra **2033b** e **2033d** e segnalata nella zona del Cilento (Camp.), è stata denominata *Ophrys cilentana* Devillers & Devillers-Tersch. Fior. IV. Sembra peraltro di dubbio valore tassonomico.

Ophrys cilentana

J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS

Étymologie: *cilentana*: [du massif] du Cilento.
Type: It, Salerno (2000). **Synonyme:** *O. arachniformis* subsp. *cilentana* (J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS) KREUTZ.

Description: plante haute de 20-40 cm; 3-12 fleurs moyennes; sépales 11-15 × 4-7 mm, ovales-allongés, blancs à rosés, moins souvent verdâtres ou verts, étalés; pétales longs de 7-9 mm, étroitement lancéolés, parfois pourvus d'une micropilosité et ciliés, les bords ondulés-crispés, verts et un peu plus foncés que les sépales (sépales verts) ou le centre pâle, blanc à rosé (sépales blancs à roses), les bords parfois plus foncés, jaunes à ocrés; labelle entier, trapézoïforme ou ovoïde à rhomboïdal, 10-14 (-16) × 11-16 mm (étalé), ± fortement convexe transversalement, brun foncé à brun noirâtre foncé, muni parfois d'ébauches de gibbosités, les bords ± réfléchis, jaune verdâtre; pilosité submarginale dense, pourprée, parfois atténuée dans les quarts latéro-distaux; macule variée et complexe, en forme de H ou de X empâté, morcelé, marqué d'ocelles ± nets, rougeâtre à bleuâtre, brillante, liserée de blanchâtre; appendice jaunâtre assez petit, triangulaire, dirigé vers le bas, inséré dans une échancrure nette; cavité stigmatique étranglée à la base, généralement munie d'une plage maculaire claire, importante, parfois contrastante; pseudo-yeux noirs à grisâtres, largement cerclés de blanchâtre, reliés aux parois externes par une bride pâle; points staminodiaux parfois présents. **Variabilité:** espèce très variée, avec de nombreux individus peu spectaculaires, peu colorés, au petit labelle muni d'une macule simple.

Floraison: III-IV. **Habitat:** de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à acides, secs à frais; pelouses maigres, garrigues, friches, broussailles, jusqu'à 700 m d'alt. **Répartition:** tyrrhénienne: du nord de la baie de Naples au mont Polino; centrée sur le Cilento. **Pays:** It.

Pollinisateur: *Andrena florentina* (Hyménoptères Andrenidae).



Photos A-B: It, Salerno, 5.IV.2001; 1.IV.2002, P. DELFORGE; **C:** 14.IV.2000, J. DEVILLERS-TERSCHUREN.