



Serapias vomeracea (N.L. Burman) Briquet subsp. **orientalis** Greuter



mediano del labello più largo e generalmente più scuro.

Periodo di fioritura

Da metà marzo a fine aprile.

Distribuzione

Mediterranea orientale, dall'Italia meridionale alla Turchia.

Habitat

Pascoli magri, garighe, boschi luminosi, fino a 500 m di altitudine, su suolo calcareo o sabbioso, asciutto o debolmente umido.

Status e conservazione

In Italia è segnalata solo nella Puglia, dal Promontorio del Gargano al Salento, e nella Sicilia meridionale.

Sistemática

Sinonimi: *Serapias orientalis* E. Nelson (nom. illeg.); *S. orientalis* (Greuter) H. Baumann et Künkele; *S. orientalis* E. Nelson subsp. *apulica* E. Nelson (nom. illeg.); *S. apulica* (H. Baumann et Künkele) P. Delforge; *S. orientalis* (Greuter) H. Baumann et Künkele subsp. *siciliensis* Bartolo et Pulvirenti.

Non ritengo giustificata la separazione a livello specifico di *Serapias orientalis* da *S. vomeracea*; d'altra parte lo stesso Nelson (1968), che per primo ha descritto questa orchidea, segnalava la presenza di forme intermedie. I popolamenti italiani, descritti appresso, vengono qui considerati semplici varietà, soprattutto a causa della loro grande variabilità.

Descrizione

Differisce da *Serapias vomeracea* subsp. *vomeracea* per l'aspetto generale più robusto, l'altezza mediamente inferiore (15-25 cm), l'infiorescenza più densa e composta da un numero inferiore di fiori (da 2 a 7), le brattee più larghe, il lobo